

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

КАРДИОВАЛЕН

наименование лекарственного препарата

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

- *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось, или улучшение не наступило через 7-10 дней.*

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Кардиовален

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав (на 100 мл)

Активных компонентов

Желтушника раскидистого экстракта жидкого	– 17,2 мл
Адонизида концентрированного	– 30,3 мл
Валерианы корневищ с корнями свежих настойки	– 48,6 мл
Боярышника экстракта жидкого	– 2,2 мл
Камфоры синтетической	– 0,4 г
Натрия бромид	– 2,0 г

Вспомогательного вещества

Спирта этилового 95 % (этанол)	– 1,9 мл
--------------------------------	----------

Описание

Жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Кардиотоническое средство растительного происхождения.

Код АТХ

[C01AX].

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат. Обладает кардиотоническим и седативным действием, обусловленным входящими в его состав компонентами.

Показания к применению

Нейро-циркуляторная дистония, в составе комплексной терапии хронической сердечной недостаточности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эндокардит, миокардит, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 15-20 капель в небольшом количестве воды 1-2 раза в день за 30-40 минут до еды. Длительность применения препарата 20-30 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, головная боль, мышечная слабость, сонливость.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат усиливает действие снотворных, седативных и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему, что требует коррекции доз при совместном применении.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт, что может вызвать снижение психомоторных реакций, что следует учитывать при управлении транспортными средствами и занятиями потенциально опасными видами деятельности.

Особые указания

Перед приемом препарата следует проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит не менее 28 % этанола. В максимальной суточной дозе препарата (30-40 капель) – содержится до 0,6 г абсолютного этилового спирта.

Препарат содержит сердечные гликозиды. При передозировке сердечными гликозидами возможно появление следующих симптомов: выраженная брадикардия, политопная экстрасистолия, бигеминия или тригеминия, замедление желудоч-ковой проводимости; в тяжелых случаях – трепетание желудочков. При интоксикации, связанной с передозировкой препаратов сердечных гликозидов, делают перерыв в их применении, при необходимости назначают препараты калия и антиаритмические средства.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь. По 15, 25 или 50 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла. Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год 6 мес.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/предприятие, принимающее претензии

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, корп. 84, корп. 87, зд. 90.